

О прохождении весенне-летнего половодья на реках Камчатского края в 2025 году

Сформировавшийся нестабильный температурный режим в мае-июне 2025 года существенно повлиял на характер половодья. За счет прерывистого характера снеготаяния половодье на большинстве рек Камчатского края прошло несколькими пиками. На реке Большая Воровская в районе села Соболево Соболевского муниципального района максимальный уровень половодья отмечался еще в третьей декаде мая, на 7 дней раньше нормы. В условиях небольших снегозапасов, сформировавшихся в зимний период 2024-2025 гг., и дефицита осадков, высота максимального уровня половодья оказалась ниже на 0,2 м.

Раньше среднемноголетних сроков на 5-10 дней, в период 03-11 июня 2025 года, сформировались максимальные уровни половодья: в верхнем течении реки Камчатка и на ее притоках Мильковского муниципального округа, на реках Быстринского муниципального округа, на реке Амчигача районе села Усть-Большерецк

Усть-Большерецкого муниципального округа, на реке Плотникова в районе поселка Дальний Елизовского муниципального округа и на реках Олюторского муниципального района. На большинстве рек Пенжинского муниципального района максимальные уровни половодья также сформировались при прохождении второго пика половодья, но в сроки близкие к норме (период 08-11 июня). В период 17-25 июня, в сроки близкие к норме, прошли максимальные уровни половодья на большинстве рек Елизовского, Усть-Камчатского муниципальных образований Камчатского края, за исключением реки Большая Быстрая в районе села Малки Елизовского муниципального округа, там формирование максимального уровня половодья происходило в условиях наложения дождевых паводков на волну половодья, что привело к сдвигу срока формирования максимального пика половодья на 7 дней позже.

Максимальные уровни половодья на большинстве водных объектов Камчатского края, в основном, сформировались во вторую волну половодья, при этом уровни воды были выше среднемноголетних значений: на реке Камчатка и ее притоках – на 0,2-0,4 м, на большинстве рек Пенжинского муниципального района – на 0,9-1,3 м; на большинстве рек Елизовского муниципального округа – в пределах нормы, на



реках Усть-Большерецкого и Соболевского муниципальных округов на 0,4 м меньше нормы.

При формировании максимальных уровней воды половодья разливы воды с затоплением пойм на глубину 0,2-0,4 м отмечались на реках: Кашкан у села Пущино, Камчатка у села Пущино, Камчатка у села Верхне-Камчатск, Камчатка у села Долиновка, Кирганик у села Кирганик, Камчатка у села Лазо Мильковского муниципального округа; Камчатка у поселка Ключи Усть-Камчатского муниципального округа; Большая Быстрая у села Малки Елизовского муниципального округа.

Уровни воды категории неблагоприятного гидрологического явления наблюдались на реке Тигиль у села Тигиль Тигильского муниципального округа, на реке Камчатка в районе села Верхне-Камчатск Мильковского муниципального округа, на реке Оклан у села Оклан Пенжинского муниципального района, без ущерба.

В период формирования волны половодья на реках: Елизовского (река Половинка и река Авача у города Елизово), Олюторского (река Апука у села Ачайваям) и Пенжинского (река Энычаваям у села Таловка) муниципальных образований края отмечались процессы боковой эрозии, приводящие к размыву и обрушению берегов.



На реках Камчатского края, в период прохождения весенне-летнего половодья 2025 года, опасных гидрологических явлений не отмечалось.